

富士ノ籠坂峠ハふじあざみノ名所デアル。昭和十年十月ノ半バ、牧野先生ノ驥尾ニ附シテ山中湖畔カラ須走へトコノ峠ヲ越エタ。時恰モ落葉松ガ漸ク黄バミカケタ頃、滿目ふじあざみノ大群トイツテモヨイ程ニアノ重タゲナ紅紫ノ頭花ガエレテ居タ。ソノ中デタツターケ所=数本ノ白花品ガアツタノヲ牧野先生ガ見付ケ出サレタ。常ノ品ト違ツテ花ハ純白、總苞片ハ云フニ及バズ花軸モ枝モ紫色ハ微塵モナイ。シバラクウツトリト 眺メテ居タ 位清楚ナモノデアツタ。標本ニナツテモラウ前ニ紀念撮影ヲシタノガコ、ニ出シタ 寫眞デアル。高サハ1m. 位デアツタ。コレニツイテハ北村四郎氏ガ旣ニ昭和六年ニ駿河國安倍郡梅ケ鳥村ノ産品デ發表シテ居ル。花ガ白イトダケアルノデホンノ一寸蛇足ヲ添ヘル。(前川文夫)



Cirsium purpuratum Matsumura var. albiflorum Kitamura, Compositæ Novæ Japonicæ: 12 (1931, Kvoto).

"Flores albi." Involucri squamæ ramique dilute virides nunquam purpurei, "cetera ut in typico."

Hab. Hondo, prov. Suruga, Umegashima-mura (fide Кітамика), prov Kai, tractu Kagosaka (Макіло et F. Маєкаwa, Oct. 15, 1935). (F. Маєкаwa).

Oからふといはひげ

最近中路正義氏が樺太ノ九州帝大演習林カラいはひげノ 一種ヲ持チ 歸ヘラレタ。故工藤 祐舜博士が同演習林植物目錄= Cassiope tetragona D. Don ヲ記サレテヰルノデ同種カト 思ツタガ、調ベテミルト Cassiope ericoides D. Don デアツタ。いはひげョリズツト太ク、 葉ハ稍疎=着キ大キク、長サ (2-)3-5 mm. 背面=深イ一條ノ溝ガアリ、縁部=ハ淡褐色ノ 鬚毛ガ列生シテキル。殘念ナガラ花ハナカツタガ、去年ノ果實ガ 殘ツテキテ、果梗ハ 長サ 7-12 mm. アツタ。西ハばいかる地方カラ東ハおほつく・うすりー地方=分布シテキル種類 デ、かむちやつか半島=モ記錄ハアルガ誤リラシイ。工藤博士ガ C. tetragona トサレタモ ノモ同一ト思フノデ、棒太廳中央試験所報告第一類第一號デ石山哲爾氏ノツケラレタ から ふといはひげヲ和名トシテ採用シテオク。

Cassiope ericoides D. Don in New Philos. Journ. XVII, p. 158 (1834). Syn. Andromeda ericoides Pallas, Fl. Ross. II, p. 56, t. 73, fig. 3 (1788).

Nom. Jap. Karafuto-iwahige.

Hab. Saghalien: in Experimental Forest of Kyushu Imperial University.


(H. HARA)

Oはごろもえぞにはとこ

(Sambucus Buergeriana
BLUME VAR. lacera NAKAI)
1891 年故 FAURIE 師が北海道
札幌附近デ發見シテ以來久シク
採集家ノ目ヲ逃レテヰタガ數年
前王子製紙會社山林部ラオイン教・主
大ニョツテ膽振國、白老郡、・東
生村ノ社有林内デ見出サレタ。
細カク切レタ葉ハ、ソノ帶黄白
色ノ花或ハ紅色ノ果實ト相俟ツテ頗ル美事デアル。現在デハ虎
材質へ移植サレ大切=保護サレテヰル。
(原 寛)

Oさはをぐる

飯沼愁齋翁ハ草本圖説ニさは をぐるまトをかをぐるまヲ區別 シテ圖解シタガ、牧野博士がコ ノ兩者ヲ同一デアルトサレテカ ラハズツトソノ様ニ考ヘラレテ キタ。併シ最近筆者ハコノ兩形 が可成り異ツテヰル事ニ注意ヲ 惹カサレタ。さはをぐるまノ基 本形ハをかをぐるまニ比シ水分



はごろもえぞにはとこ

多イ所=生エ全形壯大デ葉ハ細長ク、莖上葉ハ數多ク、花ノ數モ多ク、總苞ノ綿モハ少イ。